

Guía De Atención Integral (GAI) para la detección, tratamiento y seguimiento de leucemias linfóide y mieloide y linfoma no Hodgkin en población mayor de 18 años

1.1. Título Sub-guía: Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento del linfoma folicular en pacientes adultos.

Diagnóstico

Pregunta 1: ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y hallazgos principales en individuos mayores de 18 años para que se sospeche linfoma folicular? (PREGUNTA DE BUENA PRACTICA)

Pregunta N°2: ¿Cuáles son los procedimientos requeridos para el diagnóstico de Individuos mayores de 18 años con sospecha de linfoma folicular? (PREGUNTA DE BUENA PRACTICA)

Pregunta N°3: ¿Cuáles son los procedimientos requeridos para la estadificación de individuos mayores de 18 años con sospecha de linfoma folicular? (PREGUNTA DE BUENA PRÁCTICA)

Pregunta N°4: ¿Cuál es la estrategia más efectiva para el tratamiento de pacientes con diagnóstico de linfoma folicular con baja carga tumoral?

Población	Exposición/ Intervención	Comparación	Desenlace
Individuos mayores de 18 años con diagnóstico confirmado de linfoma folicular con baja carga tumoral	Rituximab	Observación	- Supervivencia global - Supervivencia libre de recaída - Tasa de recaída - Supervivencia global de acuerdo a factores pronósticos - Eventos adversos

Pregunta N°5: ¿Cuál es el tratamiento más efectivo y seguro para pacientes con diagnóstico nuevo de linfoma folicular?

Población	Exposición/ Intervención	Comparación	Desenlace
Pregunta 4A Individuos mayores de 18 años con diagnóstico nuevo de linfoma folicular en Estadio I	1. Quimioterapia 2. Rituximab 3. Observación	Radioterapia de campo comprometido	Supervivencia global Supervivencia libre de recaída Tasa de remisión completa Tasa de recaída Supervivencia global de acuerdo a factores pronósticos Eventos adversos
Pregunta 4B Individuos mayores de 18 años con diagnóstico nuevo de linfoma folicular en Estadio II, III y IV	1. Rituximab + quimioterapia	<u>Quimioterapia</u> o Radioterapia de campo comprometido	

Pregunta N°6: ¿Cuál es el rendimiento diagnóstico del PET-SCAN comparado con el TAC para la valoración final de la respuesta post tratamiento de primera línea en individuos con diagnóstico de linfoma folicular?

Población	Exposición/ Intervención		Desenlace
Individuos mayores de 18 años con diagnóstico de linfoma folicular pos tratamiento de primera línea	PET	TAC de cuello, tórax, abdomen y pelvis	Sensibilidad Especificidad Exactitud diagnóstica Supervivencia global Supervivencia libre de recaída Tasa de remisión completa Tasa de recaída Supervivencia global de acuerdo a factores pronósticos

Pregunta N°7: ¿Cuál es el esquema de mantenimiento más efectivo y seguro con rituximab en individuos mayores de 18 años con diagnóstico confirmado de linfoma folicular en remisión completa?

Población	Exposición/ Intervención	Comparación	Desenlace
Individuos mayores de 18 años con diagnóstico confirmado de linfoma folicular en remisión completa	Rituximab mantenimiento	Observación	- Supervivencia global - Supervivencia libre de recaída - Tasa de recaída - Supervivencia global de acuerdo a factores pronósticos - Eventos adversos

Pregunta N°8: ¿Cuál es el tratamiento más efectivo y seguro para individuos mayores de 18 años con diagnóstico confirmado de linfoma folicular en primera recaída?

Población	Exposición/ Intervención	Comparación	Desenlace
Individuos mayores de 18 años con diagnóstico confirmado de linfoma folicular en primera recaída	Monoterapia: Rituximab Rituximab + Quimioterapia	Esquemas basados en Fludarabina + rituximab*	- Supervivencia global - Supervivencia libre de recaída - Tasa de remisión completa - Tasa de recaída - Supervivencia global de acuerdo a factores pronósticos - Eventos adversos
	Radioimmunoterapia (tositumomab o ibritumomab)		

Pregunta N°9: ¿Cuál es la efectividad y seguridad del trasplante de médula ósea en pacientes con linfoma folicular?

Población	Exposición/ Intervención	Comparación	Desenlace
Individuos mayores de 18 años con diagnóstico confirmado de linfoma folicular	Trasplante autólogo de médula ósea	Quimioterapia	- Supervivencia global - Supervivencia libre de enfermedad - Eventos adversos
	Trasplante alogénico de médula ósea	Quimioterapia	